

令和6年(2024年)

りんご病害虫防除暦

JAごしょつがる JAごしょつがるりんご共防連

農業の使用にあたっては、使用時期や年間使用回数などの「農業使用基準」を守る。また、事前に周辺住民に対し、農薬の散布日時や使用者の連絡先等を十分な時間的余裕を持って知らせる。

Main calendar table with columns for month, date, pest/disease, and recommended treatments. Includes sections for '1,000倍当りの薬量' and '散布履歴記入欄'.

病害虫防除上の注意

Vertical sidebar containing detailed notes and diagrams for various pests and diseases, including 'マメコバチの管理', 'キンモンホソガ・ギンモンハモグリガ対策', and 'うどんこ病対策'.

主な栽培管理

Vertical sidebar containing cultivation management notes such as '剪枝の注意', '摘果の注意', '収穫後の注意', and '病害虫防除の注意'.

殺菌剤の適用表

Table listing fungicide applications with columns for agent name, FRAC code, and application details.

殺虫剤の適用表

Table listing insecticide applications with columns for agent name, FRAC code, and application details.

殺ダニ剤の適用表

Table listing acaricide applications with columns for agent name, FRAC code, and application details.

塗布剤の適用表

Table listing application agents with columns for agent name, FRAC code, and application details.

○: 本防除暦で防除期として適用するもの。 △: 〇印の病害に適用した場合、防除の必要がないもの。

○: 本防除暦で防除期として適用するもの。 △: 〇印の害虫に適用した場合、防除の必要がないもの。

※ダニシラバ、スターマイト、ダニゴキは合わせて年1回の使用とする。

収穫前の規制に注意 散布する農薬の農業使用基準(収穫前日数・年間使用回数)をよく確認しましょう。

令和6年 (2024年)

りんご病害虫防除暦

CONR 非設置体系

JAごしょつがる JAごしょつがるりんご共防連

農業の使用にあたっては、使用時期や年間使用回数などの「農業使用基準」を守る。また、事前に周辺住民に対し、農薬の散布日時や使用者の連絡先等を十分な時間的余裕を持って知らせる。

Main calendar table with columns for month, date, target pests, and recommended treatments. Includes sections for 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, and 9月.

病害虫防除上の注意

Attention section containing various pest control tips and diagrams. Includes 'マメコバチの管理', 'キンモンホソガ・ギンモンハモグリガ対策', 'モニリア病対策', 'うどんこ病対策', '訪花昆虫保護', '黒星病対策', 'クワコナカイガラムシ対策', 'ハダニ対策', '斑点落葉病対策', '有袋果のすす病対策', 'アブラムシ類対策', '炭そ病対策', '輪紋病(いぼ皮病)対策', '褐斑病対策', '腐らん病対策', and '特別散布(すす斑・すす点病対策)'. Includes a diagram of a tree with a band.

主な栽培管理

Cultivation management section with sub-sections: 剪枝(Pruning), 消毒促進(Disinfection promotion), 圃地の清掃(Orchard cleaning), 施肥(施肥) (Fertilization), 接木(Grafting), マルハバの管理(Marubaba management), 苗木の定植(Seedling planting), マメコバチの放散(Mamekobachi dispersal), 人工授粉(Artificial pollination), 摘果(果摘) (Harvesting), 小袋掛け(Netting), 摘果剤の散布(Harvesting agent application), 成り枝の誘引(Branch training), 摘果・仕上げ摘果(Harvesting and finishing), 追肥(追肥) (Topdressing), 袋掛け(袋掛け) (Bagging), 徒長枝の整理(Pruning of徒長枝), 無袋の見直し(Re-evaluation of bagging), 紋病対策(紋病対策), 支柱入れ(支柱入れ) (Support), 落果防止剤(つがる・未希ライフ・さおらなど) (Drop prevention), 褐斑病対策(褐斑病対策), 腐らん病対策(腐らん病対策), 特別散布(特別散布) (Special application), ぶじの除袋(ぶじの除袋) (Removal of bags), 収穫(収穫) (Harvest), 野ネズミ対策(野ネズミ対策), 雲霧対策(雲霧対策), 塗布剤の適用表(塗布剤の適用表), and カルシウム剤の使い方(カルシウム剤の使い方).

殺菌剤の適用表

Table of fungicide applications with columns for agent name, FRAC code, and target diseases.

殺虫剤の適用表

Table of insecticide applications with columns for agent name, FRAC code, and target pests.

殺ダニ剤の適用表

Table of acaricide applications with columns for agent name, FRAC code, and target mites.

○、△: 本防除暦で防除期として適用するもの。 △: ①の病害に適用した場合、防除の必要がないもの。

○: 本防除暦で防除期として適用するもの。 △: ①の害虫に適用した場合、防除の必要がないもの。

※ダニシラバ、スターマイト、ダニコグは合わせて年1回の使用とする。(注意) 1. サマイトは落花直後に使用しない。